



纳米二氧化锆对人永生化角质形成细胞 组蛋白H3修饰的影响*

赵晓旭^{1,2)**} 姚燕坊³⁾ 侯巧利⁴⁾

(¹⁾ 福建省新型污染物生态毒理效应与控制重点实验室, 莆田 351100; ²⁾ 生态环境及其信息图谱福建省高等学校重点实验室, 莆田 351100;
³⁾ 莆田学院环境与生物工程学院, 莆田 351100; ⁴⁾ 福州大学环境与安全工程学院, 福州 350108)

摘要 **目的** 阐明纳米二氧化锆暴露对人永生化角质形成细胞 HaCaT 组蛋白 H3 常见修饰位点的影响, 探讨组蛋白 H3 修饰变化的潜在机制, 为纳米材料的进一步安全应用提供理论基础。**方法** 在利用扫描电子显微镜、激光粒度仪、X 射线衍射仪等技术对纳米二氧化锆进行详细表征的基础上, 通过蛋白质免疫印迹及流式细胞术等方法评价纳米二氧化锆暴露对细胞生存率、细胞内蓄积量以及组蛋白 H3 修饰等的影响。**结果** 在分散介质中纳米二氧化锆明显团聚, 比表面积减少, 二次粒径增大, 其短时间内 (1 h) 即诱导了组蛋白 H3 第 10 位丝氨酸的磷酸化、第 9 及 14 位赖氨酸的乙酰化、第 4 及 27 位赖氨酸的三甲基化修饰水平的升高。进一步分析发现, 纳米二氧化锆的细胞内蓄积量及其引起的 DNA 损伤水平, 与纳米二氧化锆诱导的组蛋白 H3 修饰水平均呈线性相关。**结论** 纳米二氧化锆暴露后诱导了 HaCaT 细胞组蛋白 H3 常见修饰位点的变化, 其细胞内的蓄积是诱导组蛋白 H3 修饰变化的关键因素之一, 且组蛋白 H3 修饰的调控机制可能涉及 DNA 损伤修复途径。

关键词 纳米二氧化锆, 表观遗传学, 组蛋白修饰, 细胞内蓄积, DNA 损伤

中图分类号 Q23

DOI: 10.16476/j.pibb.2022.0408

纳米二氧化锆 (zirconium dioxide nanoparticles, ZrO₂-NPs) 因其具有较高的稳定性、光学性能和机械性能, 被广泛应用于牙科种植、生物传感器和癌症治疗等纳米医学领域^[1-3]。然而, 广泛的应用增加了 ZrO₂-NPs 对人类健康和环境暴露的风险。部分用于医用导管、敷料、凝胶等医药领域的纳米材料已被证明可以直接与皮肤、血液或淋巴系统等接触并蓄积, 产生潜在的生物学毒性^[4-5]。因此, 研究 ZrO₂-NPs 的生物学毒理效应进而评价其安全性显得尤为重要。

纳米材料因其颗粒尺寸小而产生的特异毒性“纳米毒性”已被广泛认识。纳米毒性取决于多种因素, 除了与材料的纯度、尺寸大小、化学结构、团聚状态、剂量大小及所带电荷相关外, 还与暴露时间、暴露途径以及纳米材料的表面修饰、表面活性、表面吸附能力等密切相关^[6]。不同于传统的材料, 纳米材料更容易进入人体细胞, 从而在细胞内引起细胞各种功能损伤^[7-8]。虽然不同物理化学特性的纳米材料的毒性效应存在差异, 但一般情况

下, 纳米材料粒径越小, 越容易进入人体细胞, 其潜在毒性越大^[9]。研究表明, 与纳米二氧化钛和纳米四氧化三铁相比, 纳米氧化铜具有更强的毒性, 能够诱导 DNA 损伤, 其中一个主要原因涉及细胞内蓄积量的差异^[10]。纳米银也能诱导 DNA 氧化损伤标志物 8-羟基脱氧鸟苷 (8-hydroxy-2'-deoxyguanosine, 8-OHdG) 的形成^[11]。

纳米材料引起的细胞毒性也与其诱导的组蛋白修饰 (histone modification) 变化密切相关^[12-14]。组蛋白修饰作为表观遗传学 (epigenetics) 的重要分支之一, 其在控制染色质结构与调控基因转录中发挥着重要作用^[15-16]。在各种组蛋白修饰中, 组蛋白 H3 修饰程度最高, 可通过直接影响染色质结构或招募染色质重塑复合物来调节常染色质与异染

* 国家自然科学基金 (31801462), 福建省自然科学基金 (2021J011105, 2020J05211) 和莆田学院引进人才科研启动项目 (2018055) 资助。

** 通讯联系人。

Tel: 0594-2628163, E-mail: zhaoxiaoxu0711@126.com

收稿日期: 2022-08-29, 接受日期: 2022-12-26

色质之间的动态转换^[17],在相关修饰酶的作用下调节基因激活和沉默的动态转换^[16]。此外,组蛋白H3修饰参与调控DNA损伤修复^[18-19],在细胞命运决定、细胞生长以及致癌作用的过程中也发挥着重要的作用^[20]。研究表明,纳米银被细胞内化后,诱导了组蛋白H3第10位丝氨酸(serine 10, S10)磷酸化(p-H3S10)的持续高表达,导致原癌基因*c-jun*的表达量增高^[21]。纳米金暴露后,人神经母细胞瘤细胞SH-SY5Y的H3第4位赖氨酸(lysine 4, K4)的二甲基化(Me2-H3K4)修饰水平显著降低,Me2-H3K9修饰水平则显著升高^[22]。单壁碳纳米管也可以选择性地诱导表观遗传修饰酶相关基因的上调,从而导致组蛋白H3的整体脱乙酰化^[23]。

近年来,有关纳米材料引起表观遗传效应变化的研究逐年递增。从表观遗传效应角度理解纳米材料诱导的生物毒性可以拓宽纳米毒理学研究内容,为全面评价纳米材料引起的生物效应提供新的视野,为纳米材料的进一步安全应用奠定基础。基于此,本文在利用场发射扫描电子显微镜(scanning electron microscope, SEM)、激光粒度仪、X射线粉末衍射仪(X-ray diffraction, XRD)等技术手段对ZrO₂-NPs进行详细表征的基础上,以人永生化角质形成细胞HaCaT为模型细胞,采用蛋白质免疫印迹法(Western blotting, WB)及流式细胞技术等研究手段,探究了ZrO₂-NPs作用后的细胞生存率、细胞内蓄积量以及组蛋白H3修饰变化及其潜在的调控机制。

1 材料与方法

1.1 实验材料

HaCaT细胞(上海传秋生物科技有限公司);ZrO₂-NPs(平均粒径<100 nm,美国Sigma-Aldrich公司);聚偏二氟乙烯膜(0.45 μm,美国Millipore公司);3M滤纸(3 mm,美国Thermo Fisher公司)。

1.2 实验试剂

DMEM细胞培养基(01863,美国Thermo Fisher公司);胎牛血清(193254C,美国Thermo Fisher公司);青链霉素双抗(J170027,美国Thermo Fisher公司);2.5%胰蛋白酶溶液(1911594,美国Thermo Fisher公司);WB细胞蛋白质裂解液(P0013,上海碧云天生物技术有限公司);抗体(AF1201、AF1180、AF1207、

AF5614、AF5704、AF5710、A0208,上海碧云天生物技术有限公司);BCA蛋白质定量试剂盒(BCA02,北京鼎国昌盛有限公司);WB化学发光试剂盒(TG268245,美国Thermo Fisher公司);彗星法DNA损伤检测试剂盒(KGA240,南京凯基生物科技发展有限公司)。

1.3 实验仪器

场发射扫描电子显微镜(SU8010,日本Hitachi公司);激光粒度仪(WINNER803,济南微纳颗粒仪器股份有限公司);比表面积微孔吸附仪(ASPA2460,美国Micromeritics公司);X射线粉末衍射仪(XRD-6100,日本Shimadzu公司);密闭式超声破碎仪(VCX150,美国Sonics公司);二氧化碳培养箱(3111,美国Thermo Fisher公司);酶标仪(INFINITE F50,瑞士Tecan公司);电泳仪(EPS301,美国Thermo Fisher公司);电泳槽(AE-6500,日本Atto株式会社);转膜仪(TE77,美国Thermo Fisher公司);化学发光成像系统(AI600,美国Thermo Fisher公司);流式细胞仪(A00-1-1102,美国Beckman Coulter公司);电感耦合等离子体质谱仪(7800,美国Agilent Technologies公司);生物投射电镜(HT7800,日本Hitachi公司);倒置荧光显微镜(DMi8,德国Leica公司)。

1.4 实验方法

1.4.1 细胞培养基

向DMEM细胞培养基中添加10%胎牛血清(10% DMEM)或0.5%胎牛血清(0.5% DMEM)及1%青链霉素双抗,4℃保存备用。

1.4.2 样品前处理

实验当日,称取适量的ZrO₂-NPs,用0.5% DMEM培养基配制成10~50 g/L的悬浊液。为使ZrO₂-NPs分散,使用密闭式超声破碎仪在60 W功率下超声1 min。另外,用于X射线粉末衍射及比表面积微孔表征的ZrO₂-NPs及其悬浊液在测试前,经-50℃、24 h真空冷冻干燥处理后置于干燥器内保存备用。

1.4.3 纳米材料表征

场发射扫描电子显微镜表征:将适量待测样品均匀涂抹或滴加于导电胶上,喷金150 s后上机测试。测试参数为扫描加速电压10~13 kV,加速电流10 μA,显示分辨率70~110 K。

动态光散射表征:ZrO₂-NPs的流体动力学粒径(二次粒径)及其分布采用动态光散射法

(dynamic light scattering, DLS) 表征。测试参数为折射角度 90° , 分散介质折射率 1.333, 介质黏度 $0.000\ 890\ 4\ \text{Pa}\cdot\text{s}$, 粒度测试范围为 $1\sim 10\ 000\ \text{nm}$, 设备延迟单位时间 $10\ \mu\text{s}$ 。

X射线粉末衍射表征: 取适量经干燥处理后的待测样品置于样品槽, 用玻璃板压片压平待测样品, 随后测试。测试参数为仪器铜靶辐射源 $\text{CuK}\alpha$ ($\lambda=1.540\ 56\ \text{\AA}$), 扫描速度为 $2^\circ/\text{min}$, 扫描角度为 $4^\circ\sim 90^\circ$ 。

比表面积微孔表征: 比表面积微孔表征采用氮气吸附-脱附 (Brunauer-Emmett-Teller, BET) 表征方法。分别称取 $0.1\sim 0.2\ \text{g}$ 经干燥处理后的待测样品置于 BET 试管底部, 随后使用真空干燥脱气仪在 200°C 条件下对待测样品脱气 $2\ \text{h}$ 。在相对压力 P/P_0 为 0.99 及 -195.85°C 条件下获得氮气吸附-脱附等温曲线。 P/P_0 在 $0.05\sim 0.35$ 之间线性拟合。

1.5 传代细胞培养

HaCaT 细胞经 0.25% 胰蛋白酶溶液消化传代后, 接种于含 10% DMEM 细胞培养基的 $100\ \text{mm}$ 细胞培养皿中, 置于 37°C 、 $5\%\ \text{CO}_2$ 及饱和湿度的 CO_2 培养箱中静置培养, 细胞贴壁面积达到 $70\%\sim 90\%$ 之间时传代 1 次。

1.6 供试细胞准备

取对数生长期的 HaCaT 细胞, 接种于 $35\ \text{mm}$ 细胞培养皿, 细胞贴壁面积达到 $70\%\sim 90\%$ 之间时, 用 0.5% DMEM 细胞培养基冲洗细胞 2 次后, 细胞在 0.5% DMEM 细胞培养基中继续培养 $24\ \text{h}$ 。

1.7 样品暴露

细胞在 0.5% DMEM 中培养 $24\ \text{h}$ 后, 弃掉旧培养基, 加入含样品的新鲜 0.5% DMEM 细胞培养基, 使样品最终浓度为 $0.1\sim 1\ 000\ \text{mg/L}$ 后, 置于培养箱中静置培养 $0.5\sim 72\ \text{h}$ 。每批次实验对照组以未加入样品的细胞为空白对照, 每个浓度单次实验中设置 3 个重复, 各组实验独立重复 3 次。

1.8 细胞生存率检测

至暴露时间点, 弃培养基, 磷酸盐缓冲液 (phosphate buffer saline, PBS) 冲洗细胞 2 次, 0.25% 胰蛋白酶溶液消化并收集细胞, 制备单细胞悬液。将细胞悬液与台盼蓝染色液按 $1:1$ 吹打混匀后移至血球计数板。使用倒置显微镜观测细胞数量, 并记录数值进行统计。

1.9 蛋白质免疫印迹法

至暴露时间点, 细胞刮刀剥离细胞并移至离心管, PBS 冲洗 2 次后弃上清液。随后向样品中添加

适量 WB 细胞蛋白质裂解液, 超声破碎 $1\ \text{min}$ 后于 4°C 静置 $2\ \text{h}$ 。样品蛋白质提取后参照 BCA 蛋白质定量试剂盒说明书进行蛋白质定量。将定量过的蛋白质样品与蛋白质凝胶电泳上样缓冲液按 $1:1$ 比例充分混合。样品经电泳、转膜、染色、脱色、封闭后, 在 4°C 下一抗孵育 $12\ \text{h}$ 。随后, 室温下二抗孵育 $2\ \text{h}$ 后上机检测。选取不受外界刺激影响的 H3 含量作为内参, 蛋白质条带的影像采用 Photoshop 2020 软件进行分析统计。

1.10 观察纳米二氧化锆的细胞内分布

利用透射电子显微镜 (transmission electron microscope, TEM) 观察细胞内 $\text{ZrO}_2\text{-NPs}$ 的分布情况。不同剂量梯度的 $\text{ZrO}_2\text{-NPs}$ ($0\sim 1\ \text{g/L}$) 暴露 $1\ \text{h}$ 后, 细胞刮刀剥离细胞并移至离心管, PBS 冲洗 2 次后弃上清液。沿管壁缓慢加入 4°C 预冷的 2.5% 戊二醛固定液后于 4°C 静置 $24\ \text{h}$ 。样品经锇酸固定、脱水、渗透、包埋、超薄切片、双染色后上机观察。

1.11 纳米二氧化锆的细胞内蓄积量检测

利用流式细胞仪侧向角 (side scattered light, SS) 的变化研究细胞内纳米材料的蓄积量^[21]。细胞摄入纳米材料颗粒后, 细胞内部精细结构和细胞粒度改变, 引起 SS 增加。至暴露时间点, 弃培养基, PBS 冲洗细胞 2 次, 0.25% 胰蛋白酶消化并收集细胞, 制备单细胞悬液。将细胞悬液移至新的流式管, 使用流式细胞仪检测, 每组数据检测 $10\ 000$ 个细胞, 每组样品检测 3 次, 采用 FlowJo 10.7.1 软件对所得实验结果进行分析。

利用电感耦合等离子体质谱仪 (inductively coupled plasma-mass spectrometry, ICP-MS) 验证细胞内 $\text{ZrO}_2\text{-NPs}$ 的蓄积量。不同剂量梯度的 $\text{ZrO}_2\text{-NPs}$ ($0\sim 1\ \text{g/L}$) 暴露 $1\ \text{h}$ 后, 弃培养基, PBS 冲洗细胞 2 次, 0.25% 胰蛋白酶消化并收集细胞, 制备单细胞悬液, 然后进行计数。将 1×10^5 个细胞移至新的 $15\ \text{ml}$ 离心管, 随后加入 $3\ \text{ml}$ 65% 硝酸及 $2\ \text{ml}$ 氢氟酸, 室温下震荡 $24\ \text{h}$ 后, 移至聚四氟乙烯管中 180°C 除酸 $2\ \text{h}$, 随后用 2% 硝酸定容至 $50\ \text{ml}$ 上机测试。

1.12 彗星实验

不同剂量梯度的 $\text{ZrO}_2\text{-NPs}$ ($0\sim 0.1\ \text{g/L}$) 暴露 $1\ \text{h}$ 后, 弃培养基, PBS 冲洗细胞 2 次, 0.25% 胰蛋白酶消化并收集细胞, 制备单细胞悬液后, 参照彗星法 DNA 损伤检测试剂盒说明书进行实验。样品经裂解、DNA 碱解旋、电泳、染色后上机观察。

2 结 果

2.1 ZrO₂-NPs表征

图 1a 为 ZrO₂-NPs 及经 0.5% DMEM 分散处理的 ZrO₂-NPs 的 SEM 图像。与供应商标注信息基本一致,未分散前的 ZrO₂-NPs (左) 呈现较为规则的球形,单个颗粒粒径 (一次粒径) 约为 100 nm,颗粒之间界线分明,呈分散堆叠、松散聚集状态,表明颗粒之间黏性较低。经 0.5% DMEM 分散处理后的 ZrO₂-NPs (右) 呈现不规则球形,颗粒之间界线模糊,颗粒之间黏性显著升高,出现明显团聚现象,其粒径 (二次粒径) 介于 100~500 nm 之间。为了进一步评估 ZrO₂-NPs 在 0.5% DMEM 中的分散情况,进行 DLS 测试分析。经 0.5% DMEM 分散处理后, ZrO₂-NPs 的分散指数 (PI) 为 0.280 6, 粒径分布较为集中,液相分布较

为均匀,其粒径分布集中在 200~400 nm 之间。经统计分析得出 ZrO₂-NPs 的 DLS 平均粒径 (二次粒径) 为 332.49 nm,与一次粒径 (<100 nm) 相比,由于团聚其二次粒径增大约 3 倍 (图 1b)。另外,由图 1c 可知,两种样品的吸附-脱附等温曲线均为 IV 型,在相同压力下, ZrO₂-NPs 的吸附量大于经 0.5% DMEM 分散处理后的 ZrO₂-NPs,其 BET 比表面积分别为 (32.399 7±0.132 6) m²/g 及 (16.290 6±0.161 0) m²/g。表明 ZrO₂-NPs 堆积松散,其孔间隙更大,而经分散处理后的 ZrO₂-NPs 则由于聚集程度高,其孔间隙更小。XRD 分析结果表明, ZrO₂-NPs 的晶型为单斜晶 (monoclinic),粉末衍射文件 (powder diffraction file, PDF) 卡片号为 86-1449,且无论分散 (团聚) 与否其晶型特征无明显变化,均能保持良好的晶型结构 (图 1d)。实验结果表明,经 0.5% DMEM 分散处理后,由于团聚 ZrO₂-NPs 的比表面积减小、粒径增大。




Fig. 1 Physicochemical properties of ZrO₂-NPs in dispersion medium

The morphology and microscopic structure information of ZrO₂-NPs were acquired by the SEM (a), DLS (b), BET (c) and XRD (d).

2.2 ZrO₂-NPs暴露后细胞生存率的变化

为了确定 ZrO₂-NPs 对 HaCaT 细胞生存率的影响,利用台盼蓝染色法测定 ZrO₂-NPs 暴露后的细胞生存率 (图 2)。实验结果表明,不同剂量梯度的 ZrO₂-NPs (0~1 g/L) 暴露 24 h 后, HaCaT 细胞

生存率略有下降,但不明显。实验最大剂量 (1 g/L) 作用 24 h 后, HaCaT 细胞生存率仅下降约 10%,与对照组生存率 (92%) 基本一致 (图 2a)。另外,观察较低剂量的 ZrO₂-NPs 长时间暴露对 HaCaT 细胞生存率的影响。不同时间梯度的实验结果表明,

0.1 g/L ZrO₂-NPs 长时间暴露后, HaCaT 细胞的生存率无明显变化, 但在暴露 36 h 后出现下降趋势 (图 2b)。细胞一旦大量死亡将导致组蛋白修饰不

能被有效检测, 因此选择 36 h 作为最大暴露时间进行之后的实验。




Fig. 2 Cell viability after exposure to ZrO₂-NPs
(a) Dose-dependent, (b) time-dependent. Cell viability after treatment with ZrO₂-NPs was determined using the Trypan blue exclusion assay.

2.3 ZrO₂-NPs对组蛋白H3修饰的影响

为了确定 ZrO₂-NPs 对组蛋白 H3 常见修饰位点的影响, 利用蛋白质免疫印迹法观察 ZrO₂-NPs 暴露后 HaCaT 细胞的 p-H3S10、组蛋白 H3 第 9 位赖氨酸 (lysine 9, K9) 的乙酰化 (Ac-H3K9)、Ac-H3K14、组蛋白 H3 第 4 位赖氨酸的三甲基化 (Me3-H3K4) 及 Me3-H3K27 修饰水平变化 (图 3)。不同剂量 ZrO₂-NPs (0~1 g/L) 暴露 1 h 后, p-H3S10 修饰水平随着暴露剂量的升高而升高, 显示出较为明显的剂量依赖性 (图 3a)。与 p-H3S10 的结果相似, Ac-H3K9、Ac-H3K14、Me3-H3K4 及 Me3-H3K27 修饰水平也随着暴露剂量的升高而

升高。另一方面, 低剂量 0.1 g/L ZrO₂-NPs 长时间 (~36 h) 暴露的结果表明 (图 3b), ZrO₂-NPs 暴露后诱导了 p-H3S10 修饰水平的升高并持续长达 24 h。同样的, 随着暴露时间的增加, 观察到 Ac-H3K9、Ac-H3K14 及 Me3-H3K4 修饰水平明显上调。另外, 0.1 g/L ZrO₂-NPs 暴露后 Me3-H3K27 修饰水平上调只持续了 2 h。实验结果表明, ZrO₂-NPs 暴露后短时间内 (1 h) 即引起了 p-H3S10、Ac-H3K9、Ac-H3K14 及 Me3-H3K4 的高表达, 并持续长达 24 h。另外, Me3-H3K27 修饰的上调在 ZrO₂-NPs 暴露 2 h 后出现下降。




Fig. 3 Histone H3 modification after exposure to ZrO₂-NPs
(a) Dose-dependent, (b) time-dependent. Histone modification after treatment with ZrO₂-NPs was detected using Western blotting.

2.4 细胞内ZrO₂-NPs的分布及其蓄积量

不同于传统材料, 纳米材料更容易进入细胞, 从而在细胞内引起各种功能损伤^[24-25]。为了探究ZrO₂-NPs对组蛋白H3修饰影响的机制, 观察ZrO₂-NPs细胞内的分布情况(图4a)。随着ZrO₂-NPs暴露剂量的增加, 细胞内可见ZrO₂-NPs颗粒成簇分布于细胞质及细胞器(如线粒体)中, 但并未观察到颗粒进入细胞核的现象。另外, 利用流式细胞仪的侧向散射光SS分析检测细胞内ZrO₂-NPs的蓄积

量。实验结果表明, ZrO₂-NPs (0~1 g/L) 暴露1 h后, SS强度以剂量依赖的方式增加(图4b)。而SS强度并未随着1 g/L ZrO₂-NPs暴露时间的增加而增强, 各暴露时间点的结果与1 h时基本一致(图4c)。为了进一步验证细胞内ZrO₂-NPs的蓄积量, 使用ICP-MS定量细胞内总锆的含量。与流式细胞仪的结果一致, 随着ZrO₂-NPs暴露剂量的增加, 细胞内总锆的含量随之增加, 显示了显著的剂量依赖性(图4d)。




Fig. 4 Intracellular distribution and accumulation after exposure to ZrO₂-NPs

The intracellular distribution and accumulation of ZrO₂-NPs were detected by the TEM (a), the flow cytometry (FCM) in dose-dependent (b), the FCM in time-dependent (c) and the ICP-MS (d).

为了进一步确定细胞内ZrO₂-NPs的蓄积量与组蛋白修饰之间的关系, 使用Photoshop 2020软件定量图3a中所示的p-H3S10、Ac-H3K9及Me3-H3K4条带, 并计算了SS和各组蛋白H3修饰强度的平均值。随着ZrO₂-NPs的暴露剂量的增加, ZrO₂-NPs的蓄积量(SS强度)和p-H3S10、Ac-H3K9及Me3-H3K4的强度平行增加(图5)。各自的相关系数为 $R^2=0.818\ 63$ 、 $R^2=0.881\ 28$ 及 $R^2=0.584\ 59$ 。

2.5 ZrO₂-NPs诱导DNA损伤形成

为了确定进入细胞内的ZrO₂-NPs是否引起DNA损伤, 使用图3同样本观察ZrO₂-NPs暴露后DNA损伤标志物组蛋白H2AX第139位丝氨酸的磷酸化(γ -H2AX)修饰水平。不同剂量ZrO₂-NPs (0~1 g/L) 暴露1 h后, γ -H2AX修饰水平随着暴露剂量的升高而升高, 显示出明显的剂量依赖性(图6a)。0.1 g/L ZrO₂-NPs长时间(~36 h)暴露后诱导了 γ -H2AX修饰水平的升高并持续长达36 h




Fig. 5 Correlation between intracellular accumulation of ZrO₂-NPs and histone H3 modification
(a) p-H3S10 and SS, (b) Ac-H3K9 and SS, (c) Me3-H3K4 and SS. Histone H3 modification was determined using Western blotting, where the intensity of each band was extracted using Photoshop 2020. The extent of histone H3 modification in cells treated with ZrO₂-NPs, versus untreated control cells, was calculated. Correlations were calculated using the least-squares method.




Fig. 6 γ -H2AX modification after exposure to ZrO₂-NPs
(a) Dose-dependent, (b) time-dependent, (c) dose-dependent. DNA damage after treatment with ZrO₂-NPs was detected using the Western blotting or Comet assay.

(图6b)。另外,使用彗星实验进一步验证了ZrO₂-NPs诱导的DNA损伤(图6c)。

为了进一步确定细胞内ZrO₂-NPs的蓄积量与DNA损伤以及DNA损伤与组蛋白H3修饰之间的关系,绘制DNA损伤(γ -H2AX)与SS强度、DNA损伤与p-H3S10、Ac-H3K9、Me3-H3K4相关

性的散点图(图7)。ZrO₂-NPs的细胞内蓄积量与其诱导的DNA损伤呈线性相关($R^2=0.680\ 99$)。另外,DNA损伤与p-H3S10、Ac-H3K9及Me3-H3K4的强度平行增加,各自的相关系数为 $R^2=0.726\ 29$ 、 $R^2=0.912\ 69$ 和 $R^2=0.599\ 81$ 。




Fig. 7 Correlation between DNA damage and intracellular accumulation, and between DNA damage and histone H3 modification

(a) γ -H2AX and SS, (b) p-H3S10 and γ -H2AX, (c) Ac-H3K9 and γ -H2AX, (d) Me3-H3K4 and γ -H2AX. DNA damage and histone H3 modification was determined using Western blotting, where the intensity of each band was extracted using Photoshop 2020. The extent of histone H3 modification in cells treated with ZrO_2 -NPs, versus untreated control cells, was calculated. Correlations were calculated using the least-squares method.

3 讨 论

纳米材料可以通过内吞作用或自由扩散等不同途径被细胞蓄积^[26]。本文观察到将 ZrO_2 -NPs分散在0.5% DMEM中后,明显出现团聚现象(图1)。DMEM培养基中带正电荷的离子较多,呈负电性的纳米颗粒分散后,因颗粒间的静电斥力的减弱及颗粒间稳态的失衡,导致颗粒在分散介质中产生团聚现象。此外,含有血清的细胞培养基会在纳米颗粒表面覆盖一层“蛋白冠”^[27]。蛋白冠的形成可能进一步促进纳米颗粒相互吸引,并能在液相中维持稳定。一般而言,纳米颗粒的尺寸越小越容易进入细胞^[28]。纳米颗粒在分散介质中的团聚明显会影响其进入细胞的能力。然而,也有报道指出“蛋白冠”的形成会为纳米颗粒表面提供新的生物结合位点。在生物系统内,纳米颗粒表面吸附的组分可为免疫系统提供特异性,从而使纳米颗粒顺利进入细胞^[29]。多项研究证实,纳米颗粒诱导的组蛋白H3

修饰及DNA损伤与其细胞内蓄积量高度相关^[30-32]。这与本文观察到的结果一致,随着 ZrO_2 -NPs暴露剂量的增加, ZrO_2 -NPs的细胞内蓄积量及其诱导的组蛋白H3修饰及 γ -H2AX显著增加(图3a, 4a, 6a),进一步分析表明, ZrO_2 -NPs的细胞内蓄积量与组蛋白H3修饰及 γ -H2AX形成高度相关(图5、7a),间接证明了 ZrO_2 -NPs的细胞内蓄积是引起组蛋白修饰的关键因素之一。另外, ZrO_2 -NPs颗粒未能进入细胞核内,其暴露可能是引起了组蛋白H3修饰相关信号通路的变化,进而间接的导致组蛋白H3修饰变化(图4a)。

组蛋白修饰在控制染色质结构与调控基因转录中发挥着重要作用^[15-17]。p-H3S10是有丝分裂起始的关键事件常被用作判断细胞是否处于有丝分裂的标志物^[33]。本文实验结果表明, ZrO_2 -NPs能诱导p-H3S10的持续高表达(图3b)。然而,p-H3S10在 ZrO_2 -NPs暴露后立即被诱导,这与有丝分裂相关的p-H3S10存在明显差异。p-H3S10的高表达也是诱导原癌基因表达的关键因素之一^[34-36]。一些致

癌性金属, 如镍、砷等能引起 p-H3S10 修饰的改变, 从而导致基因表达的改变^[35-36]。p-H3S10 的增加会促进 Ac-H3K14 修饰水平上调^[37-38]。Ac-H3K9 及 Ac-H3K14 主要位于启动子区域, 其高表达通常与基因激活相关^[39]。在相同暴露时间点下观察到 p-H3S10 与 Ac-H3K9 及 Ac-H3K14 存在协同作用 (图 3b)。另一方面, Me3-H3K4 与组蛋白 H3 的乙酰化之间也存在协同作用^[40], 而 Me3-H3K27 是异染色质区域的主要标志, 其高表达常常被认为是转录抑制的关键^[20], 这与本文观察到的 ZrO₂-NPs 诱导组蛋白 H3 修饰变化结果高度一致。这些结果强烈表明, ZrO₂-NPs 诱导的 p-H3S10 与基因激活高度相关。

组蛋白修饰变化在 DNA 损伤修复过程中具有重要作用^[41]。DNA 一旦发生损伤, 细胞会启动组蛋白修饰等相关的 DNA 损伤修复途径^[42]。组蛋白 H3 乙酰化创造了开放的染色质结构, 为募集 DNA 修复蛋白提供了良好的环境^[18]。DNA 损伤也可以引起相关修饰酶的变化, 进而对组蛋白修饰产生影响。研究表明, 甲基转移酶 SUV39H1 可被迅速募集到 DNA 损伤区域并引起 H3K9 甲基化的迅速上调, 进而激活 DNA 损伤信号蛋白^[43]。本文的分析结果表明, ZrO₂-NPs 引起的 DNA 损伤 (γ -H2AX) 与其诱导的组蛋白 H3 修饰变化强度呈线性相关 (图 7b-d)。这些结果间接证明了 ZrO₂-NPs 引起的 DNA 损伤是其诱导组蛋白 H3 修饰变化的原因之一。另外, 发现 ZrO₂-NPs 暴露后 Me3-H3K27 修饰水平上调只持续了 2 h (图 3b), 尚不清楚原因, 这将是今后工作的重点之一。

组蛋白修饰是表观遗传学领域重要的研究内容之一, 参与染色质动态结构的维持和调节、基因激活及沉默、DNA 损伤修复等多种重要的生物学过程, 与神经系统疾病、糖尿病和癌症等各类疾病有关^[44-45]。对 ZrO₂-NPs 等金属氧化物纳米材料诱导组蛋白修饰的分子机制的进一步探究, 必将为推动纳米安全性评价系统的发展与完善, 为评估金属氧化物纳米材料的生物效应和安全性及设计应用于各种领域的金属氧化物纳米材料提供理论基础。

4 结 论

分散在 DMEM 细胞培养基中的 ZrO₂-NPs 颗粒明显团聚, 比表面积减少, 二次粒径增大, 且诱导了 HaCaT 细胞组蛋白 H3 常见修饰位点的变化。另外, 细胞内的蓄积是 ZrO₂-NPs 诱导组蛋白 H3 修

变化的关键因素之一, 组蛋白 H3 修饰的调控机制可能涉及 DNA 损伤修复途径。

参 考 文 献

- [1] Arena A, Prete F, Rambaldi E, *et al.* Nanostructured zirconia-based ceramics and composites in dentistry: a state-of-the-art review. *Nanomaterials* (Basel), 2019, **9**(10): 1393
- [2] Sengupta P, Bhattacharjee A, Maiti H S. Zirconia: a unique multifunctional ceramic material. *T Indian I Metals*, 2019, **72**(8): 1981-1998
- [3] Hassan N S, Jalil A A. A review on self-modification of zirconium dioxide nanocatalysts with enhanced visible-light-driven photodegradation of organic pollutants. *J Hazard Mater*, 2022, **423**: 126996
- [4] Mauro M, Crosera M, Pelin M, *et al.* Cobalt oxide nanoparticles: behavior towards intact and impaired human skin and keratinocytes toxicity. *Int J Env Res Public Health*, 2015, **12**(7): 8263-8280
- [5] Yang Y, Bao H H, Chai Q Q, *et al.* Toxicity, biodistribution and oxidative damage caused by zirconia nanoparticles after intravenous injection. *Int J Nanomed*, 2019, **14**: 5175-5186
- [6] Yong C Q Y, Valiyaveetil S, Tang B L. Toxicity of microplastics and nanoplastics in mammalian systems. *Int J Env Res Public Health*, 2020, **17**(5): 1509
- [7] Mao B H, Tsai J C, Chen C W, *et al.* Mechanisms of silver nanoparticle-induced toxicity and important role of autophagy. *Nanotoxicology*, 2016, **10**(8): 1021-1040
- [8] Liu W, Wu Y, Wang C, *et al.* Impact of silver nanoparticles on human cells: effect of particle size. *Nanotoxicology*, 2010, **4**(3): 319-330
- [9] Fiedler N, Laumbach R, Kelly-Mcneil K, *et al.* Health effects of a mixture of indoor air volatile organics, their ozone oxidation products, and stress. *Environ Health Persp*, 2005, **113**(11): 1542-1548
- [10] Karlsson H L, Cronholm P, Gustafsson J, *et al.* Copper oxide nanoparticles are highly toxic: a comparison between metal oxide nanoparticles and carbon nanotubes. *Chem Res Toxicol*, 2008, **21**(9): 1726-1732
- [11] Jiang X, Foldbjerg R, Mielau T, *et al.* Multi-platform genotoxicity analysis of silver nanoparticles in the model cell line CHO-K1. *Toxicol Lett*, 2013, **222**(1): 55-63
- [12] Wong B S E, Hu Q D, Baeg G H. Epigenetic modulations in nanoparticle-mediated toxicity. *Food Chem Toxicol*, 2017, **109**: 746-752
- [13] Stocco A, Karlsson H L, Coppede F, *et al.* Epigenetic effects of nano-sized materials. *Toxicology*, 2013, **313**(1): 3-14
- [14] Shyamasundar S, Ng C T, Yung L Y L, *et al.* Epigenetic mechanisms in nanomaterial-induced toxicity. *Epigenomics* (UK), 2015, **7**(3): 395-411
- [15] Tessarz P, Kouzarides T. Histone core modifications regulating nucleosome structure and dynamics. *Nat Rev Mol Cell Biol*, 2014,

- 15(11): 703-708
- [16] Kouzarides T. Chromatin modifications and their function. *Cell*, 2007, **128**(4): 693-705
- [17] Berger S L. The complex language of chromatin regulation during transcription. *Nature*, 2007, **447**(7143): 407-412
- [18] Price B D, D'andrea A D. Chromatin remodeling at DNA double-strand breaks. *Cell*, 2013, **152**(6): 1344-1354
- [19] Wang S, Meyer D H, Schumacher B. H3K4me2 regulates the recovery of protein biosynthesis and homeostasis following DNA damage. *Nat Struct Mol Biol*, 2020, **27**(12): 1165-1181
- [20] Lawrence M, Daujat S, Schneider R. Lateral thinking: how histone modifications regulate gene expression. *Trends Genet*, 2016, **32**(1): 42-56
- [21] Zhao X X, Ibuki Y. Evaluating the toxicity of silver nanoparticles by detecting phosphorylation of histone H3 in combination with flow cytometry side-scattered light. *Environ Sci Technol*, 2015, **49**(8): 5003-5012
- [22] Polverino A, Longo A, Donizetti A, *et al.* Molecular responses of cells to 2-mercapto-1-methylimidazole gold nanoparticles (AuNPs)-mmi: investigations of histone methylation changes. *J Nanopart Res*, 2014, **16**(7): 2516
- [23] Yan S H, Zhao L, Li H, *et al.* Single-walled carbon nanotubes selectively influence maize root tissue development accompanied by the change in the related gene expression. *J Hazard Mater*, 2013, **246**: 110-118
- [24] Sengul A B, Asmatulu E. Toxicity of metal and metal oxide nanoparticles: a review. *Environ Chem Lett*, 2020, **18**(5): 1659-1683
- [25] Meshan D, Ray P C, Yu H. Molecular toxicity mechanism of nanosilver. *J Food Drug Anal*, 2014, **22**(1): 116-127
- [26] Oh N, Park J H. Endocytosis and exocytosis of nanoparticles in mammalian cells. *Int J Nanomed*, 2014, **9**(Suppl 1): 51-63
- [27] Persaud I, Shannahan J H, Raghavendra A J, *et al.* Biocorona formation contributes to silver nanoparticle induced endoplasmic reticulum stress. *Ecotox Environ Safe*, 2019, **170**: 77-86
- [28] DNA, Liu W, Wu Y, *et al.* Impact of silver nanoparticles on human cells: effect of particle size. *Nanotoxicology*, 2010, **4**(3): 319-330
- [29] Donaldson K, Aitken R, Tran L, *et al.* Carbon nanotubes: a review of their properties in relation to pulmonary toxicology and workplace safety. *Toxicol Sci*, 2006, **92**(1): 5-22
- [30] Abudayyak M, Gurkaynak T A, Ozhan G. *In vitro* toxicological assessment of cobalt ferrite nanoparticles in several mammalian cell types. *Biol Trace Elem Res*, 2017, **175**(2): 458-465
- [31] Abudayyak M, Gurkaynak T A, Ozhan G. *In vitro* evaluation of cobalt oxide nanoparticle-induced toxicity. *Toxicol Ind Health*, 2017, **33**(8): 646-654
- [32] Zhao X X, Toyooka T, Ibuki Y. Silver nanoparticle-induced phosphorylation of histone H3 at serine 10 is due to dynamic changes in actin filaments and the activation of aurora kinases. *Toxicol Lett*, 2017, **276**: 39-47
- [33] Prigent C, Dimitrov S. Phosphorylation of serine 10 in histone H3, what for?. *J Cell Sci*, 2003, **116**(18): 3677-3685
- [34] Rossetto D, Avvakumov N, Cote J. Histone phosphorylation a chromatin modification involved in diverse nuclear events. *Epigenetics (US)*, 2012, **7**(10): 1098-1108
- [35] Li J, Gorospe M, Barnes J, *et al.* Tumor promoter arsenite stimulates histone H3 phosphoacetylation of proto-oncogenes *c-fos* and *c-jun* chromatin in human diploid fibroblasts. *J Biol Chem*, 2003, **278**(15): 13183-13191
- [36] Ke Q, Li Q, Ellen T P, *et al.* Nickel compounds induce phosphorylation of histone H3 at serine 10 by activating JNK-MAPK pathway. *Carcinogenesis*, 2008, **29**(6): 1276-1281
- [37] Lo W S, Trievel R C, Rojas J R, *et al.* Phosphorylation of serine 10 in histone H3 is functionally linked *in vitro* and *in vivo* to Gcn5-mediated acetylation at lysine 14. *Mol Cell*, 2000, **5**(6): 917-926
- [38] Salvador L M, Park Y, Cottom J, *et al.* Follicle-stimulating hormone stimulates protein kinase A-mediated histone H3 phosphorylation and acetylation leading to select gene activation in ovarian granulosa cells. *J Biol Chem*, 2001, **276**(43): 40146-40155
- [39] Karmodiya K, Krebs A R, Oulad-Abdelghani M, *et al.* H3K9 and H3K14 acetylation co-occur at many gene regulatory elements, while H3K14ac marks a subset of inactive inducible promoters in mouse embryonic stem cells. *BMC Genomics*, 2012, **13**: 424
- [40] Zhang T Y, Cooper S, Brockdorff N. The interplay of histone modifications - writers that read. *EMBO Rep*, 2015, **16**(11): 1467-1481
- [41] Turinetto V, Giachino C. Multiple facets of histone variant H2AX: a DNA double-strand-break marker with several biological functions. *Nucleic Acids Res*, 2015, **43**(5): 2489-2498
- [42] Van Attikum H, Gasser S M. Crosstalk between histone modifications during the DNA damage response. *Trends Cell Biol*, 2009, **19**(5): 207-217
- [43] Ayrapetov M K, Gursoy-Yuzugullu O, Xu C, *et al.* DNA double-strand breaks promote methylation of histone H3 on lysine 9 and transient formation of repressive chromatin. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2014, **111**(25): 9169-9174
- [44] Rao J S, Keleshian V L, Klein S, *et al.* Epigenetic modifications in frontal cortex from Alzheimer's disease and bipolar disorder patients. *Transl Psychiat*, 2012, **2**: 132
- [45] Portela A, Esteller M. Epigenetic modifications and human disease. *Nat Biotechnol*, 2010, **28**(10): 1057-1068

Effects of Zirconium Dioxide Nanoparticles Exposure on Histone H3 Modification in Human Skin Keratinocytes*

ZHAO Xiao-Xu^{1,2)**}, YAO Yan-Fang³⁾, HOU Qiao-Li⁴⁾


⁽¹⁾Provincial Key Laboratory of Ecology-Toxicological Effects and Control for Emerging Contaminants, Putian 351100, China;

⁽²⁾Key Laboratory of Ecological Environment and Information Atlas Fujian Provincial University, Putian 351100, China;

⁽³⁾College of Environmental and Biological Engineering, Putian University, Putian 351100, China;

⁽⁴⁾College of Environment and Safety Engineering, Fuzhou University, Fuzhou 350108, China)

Graphical abstract



Abstract Objective The effects of zirconium dioxide nanoparticles (ZrO₂-NPs) exposure on the histone H3 modification in human skin keratinocytes (HaCaT) were clarified, and the underlying mechanism of histone H3 modification changes was explored in this study to provide a theoretical basis for the further safe application of nanomaterials. **Methods** The ZrO₂-NPs were firstly characterized in detail by means of scanning electron microscope, laser particle size analyzer, X-rad diffraction, *etc.* Subsequently, the effects of ZrO₂-NPs exposure on the cell viability, intracellular accumulation and histone H3 modification were evaluated by Western blotting and flow cytometry. **Results** The results showed that ZrO₂-NPs after dispersion treatment exhibited obvious agglomeration, and their specific surface area decreased whereas the secondary particle size increased. The phosphorylation of histone H3 at serine 10, the acetylation of histone H3 at lysine 9 and 14, the trimethylation of

* This work was supported by grants from The National Natural Science Foundation of China (31801462), the Science and Technology Department of Fujian Province (2020J05211, 2021J011105), and the Science and Technology Planning project of Putian University (2018055).

** Corresponding author.

Tel: 86-594-2628163, E-mail: zhaoxiaoxu0711@126.com

Received: August 29, 2022 Accepted: December 26, 2022

histone H3 at lysine 4 and 27 were induced to upregulate by ZrO₂-NPs in a short time (1 h). Through further analysis, it was found that the intracellular accumulation of ZrO₂-NPs and the level of DNA damage caused by ZrO₂-NPs were linearly correlated with the level of histone H3 modification induced by ZrO₂-NPs.

Conclusion These results suggested that the changes of the common modification sites of histone H3 in HaCaT cells were induced after exposure of ZrO₂-NPs. The intracellular accumulation of ZrO₂-NPs is one of the key factors in its induction of changes in histone H3 modification, and regulation mechanism of histone H3 modification may be involved in DNA damage repair pathways.

Key words zirconium dioxide nanoparticles, epigenetics, histone modification, intracellular accumulation, DNA damage

DOI: 10.16476/j.pibb.2022.0408